



República Dominicana
INFLUENZA HUMANA A-H1N1

BOLETIN ESPECIAL NO. 15

FECHA: 29/07/2009

HORA: 8:00 A.M

Dirección General de Epidemiología

SITUACION MUNDIAL

De acuerdo con el informe de la Organización Mundial de la Salud, Hasta el 22 de julio de 2009, se han notificado 88.408 casos confirmados de gripe por A H1N1 incluyendo 737 defunciones en la Región de las Américas. Han notificado un total de en 34 países de la Región, durante la pandemia (H1N1) 2009.

La OMS no recomienda ninguna restricción de viajes ni el cierre de fronteras en relación con la pandemia (H1N1)

SITUACION NACIONAL

	Del 27/04 al 28/07
MORBILIDAD Y MORTALIDAD	
CASOS Y HOSPITALIZACIONES	
Total de casos sospechosos de nueva influenza A H1N1	1956
Total de casos confirmados de nueva influenza A H1N1	154
Total de casos confirmados hospitalizados	53
MUERTES Y LETALIDAD	
Total de muertes confirmadas de nueva influenza A H1N1	5
Letalidad (% de casos fallecidos)	3.2

En la República Dominicana desde el inicio de la vigilancia epidemiológica del virus de influenza A H1N1, se han estudiado por laboratorio 1956 casos de gripe, se confirmaron 9 nuevos casos del nuevo virus influenza A H1N1, para un total de 154 casos, incluye a 53 personas hospitalizadas. A la fecha se han reportado cinco (5) defunciones confirmadas.

Comisión Nacional
de
Influenza

Contenido

Vigilancia intensificada 1

Acciones específicas de control 2

Recomendaciones generales 2

Contactos

Teléfono:

(809) 686-9140


Fax: (809) 689-8395

Página Web:

www.sespasdigepi.gob.do

Distribución de Los casos

Casos confirmados nueva influenza A H1N1
por provincias de residencia.



El incremento de los casos es a expensa del Distrito Nacional (78), Santo Domingo (30), Santiago (8), la Altagracia (6), San Cristóbal (5). Peravía (4), La Vega, Puerto Plata (3). Un total de 19 provincias han reportado casos, debutan Elias Piña (1) y Maria Trinidad Sánchez (1).

ACCIONES ESPECIFICAS DE CONTROL

1. Aislamiento en sala de los casos que requieren tratamiento intra-hospitalario
2. Aislamiento domiciliario de los casos leve en su domicilio hasta tres días de desaparición de los síntomas.
3. Seguimiento de los casos y de sus contactos estrechos.
4. Cumplimiento estricto de las medidas de bioseguridad en los establecimientos de salud

RECOMENDACIONES GENERALES

Para evitar contraer la enfermedad practique frecuentemente el lavado de manos y manejo adecuado de secreciones respiratorias.

Si tiene gripe use mascarilla y evite visitar lugares concurridos. No dude en acudir al médico si además tiene dificultad respiratoria, o embarazo o enfermedades del corazón, respiratorias crónica, insuficiencia renal, VIH/SIDA y tuberculosis.

No consuma medicamentos que no sean los recomendados por un médico.