



República Dominicana
INFLUENZA HUMANA A-H1N1

BOLETIN ESPECIAL NO. 16

FECHA: 4/08/2009

HORA: 8:00 A.M

Dirección General de Epidemiología

SITUACION MUNDIAL

De acuerdo con el informe de la Organización Mundial de la Salud, Hasta el 31 de julio de 2009, se han notificado 98.179 casos confirmados de gripe por A H1N1 incluyendo 1008 defunciones en la Región de las Américas. Han notificado un total de en 35 países, durante la pandemia (H1N1) 2009.

La OMS no recomienda ninguna restricción de viajes ni el cierre de fronteras en relación con la pandemia (H1N1).

SITUACION NACIONAL

	Del 27/04 al 3/08
MORBILIDAD Y MORTALIDAD	
CASOS Y HOSPITALIZACIONES	
Total de casos sospechosos de nueva influenza A H1N1	1998
Total de casos confirmados de nueva influenza A H1N1	182
Total de casos confirmados hospitalizados	69
MUERTES Y LETALIDAD	
Total de muertes confirmadas de nueva influenza A H1N1	5
Letalidad (% de casos fallecidos)	2.7

En la República Dominicana desde el inicio de la vigilancia epidemiológica del virus de influenza A H1N1, se han estudiado por laboratorio 1998 casos de gripe, se confirmaron 28 nuevos casos del nuevo virus influenza A H1N1, para un total de 182 casos, incluye a 69 personas hospitalizadas. A la fecha se han reportado cinco (5) defunciones confirmadas.

Comisión
 Nacional
 de
 Influenza

Contenido


- Vigilancia intensificada 1
- Acciones específicas de control 2
- Recomendaciones generales 2

Contactos

Teléfono:
 (809) 686-9140
 Fax: (809) 689-8395
 Pagina Web:
www.sespasdigepi.gob.do

Distribución de Los casos

Casos confirmados nueva influenza A H1N1 por provincias de residencia.



El incremento de los casos es a expensa del Distrito Nacional (84), Santo Domingo (38), Santiago (12), la Altagracia (10), San Cristóbal (6). Peravía (4), La Vega, Puerto Plata (5). Un total de 20 provincias han reportado casos, debuta Santiago Rodriguez (1).

ACCIONES ESPECIFICAS DE CONTROL

1. Aislamiento en sala de los casos que requieren tratamiento intra-hospitalario
2. Aislamiento domiciliario de los casos leve en su domicilio hasta tres días de desaparición de los síntomas.
3. Seguimiento de los casos y de sus contactos estrechos.
4. Cumplimiento estricto de las medidas de bioseguridad en los establecimientos de salud

RECOMENDACIONES GENERALES

Para evitar contraer la enfermedad practique frecuentemente el lavado de manos y manejo adecuado de secreciones respiratorias.

Si tiene gripe use mascarilla y evite visitar lugares concurridos. No dude en acudir al médico si además tiene dificultad respiratoria, o embarazo o enfermedades del corazón, respiratorias crónica, insuficiencia renal, VIH/SIDA y tuberculosis.

No consuma medicamentos que no sean los recomendados por un médico.