



Comisión
Nacional
de
Influenza

Contenido

Vigilancia intensificada 1

Acciones específicas de control 2

Recomendaciones generales 2

Contactos

Teléfono:

(809) 686-9140

Fax: (809) 689-8395

Página Web:

www.sespasdigepi.gob.do

República Dominicana
INFLUENZA HUMANA A-H1N1

BOLETIN ESPECIAL NO. 25

FECHA: 21/10/2009

HORA: 8:00 A.M

Dirección General de Epidemiología

SITUACION MUNDIAL

De acuerdo con el informe de la Organización Mundial de la Salud, hasta el 16 octubre de 2009, se han notificado 160,020 casos confirmados de gripe por A H1N1 en 35 países de Americas. Se han notificado un total de 3,539 defunciones entre los casos confirmados en 26 países de la Región. Trinidad y Tobago reportó sus primeras defunciones durante esta semana epidemiológica.

Descripción de los casos hospitalizados y fallecidos entre casos confirmados por influenza pandémica (H1N1) 2009

Entre los casos confirmados hospitalizados, aproximadamente la mitad eran mujeres. Mientras que el mayor número de casos eran adultos jóvenes, las tasas de hospitalizaciones fueron más altas en los niños.

Las mujeres embarazadas también presentan una mayor carga de morbilidad y mortalidad. En Canadá, mientras las embarazadas representan el 1% de la población, aproximadamente el 5% de los casos hospitalizados y el 5% de las defunciones pertenecen a este grupo.


El Centro de Epidemiología del Caribe (CAREC) reporta que el 30% de sus casos hospitalizados presentan síntomas gastrointestinales, porcentaje superior a lo visto en

	Del 27/04 al 17/09
MORBILIDAD Y MORTALIDAD	
CASOS Y HOSPITALIZACIONES	
Total de casos sospechosos de nueva influenza A H1N1	2693
Total de casos confirmados de nueva influenza A H1N1	452
Total de casos confirmados hospitalizados	203
MUERTES Y LETALIDAD	
Total de muertes confirmadas de nueva influenza A H1N1	22
Letalidad (% de casos fallecidos)	5

En la República Dominicana desde el inicio de la vigilancia epidemiológica del virus de influenza A H1N1, se han estudiado por laboratorio 2693 casos de gripe, se confirmaron 25 nuevos casos del nuevo virus influenza A H1N1, para un total de 452 casos, incluye a 203 personas hospitalizadas. Las personas menores de 29 años aportan la mayor proporción de casos (79%). A la fecha se han reportado 22 defunciones confirmadas. El 82% (18/22) de las defunciones correspondió al sexo femenino y de estas el 55% (12/22) tiene antecedentes de embarazo como factor de riesgo.

Distribución de Los casos

Casos confirmados nueva influenza A H1N1 por provincias de residencia.



Las provincia con mayor número de casos de gripe confirmados a influenza AH1N1 son el Distrito Nacional (143), Santo Domingo (102), Santiago (61), Puerto Plata (27), La Altagracia (21), Duarte (14) San Cristóbal(13), Españat (9),Valverde(7) Peravía (6), La Vega (5),Monte Cristi (5), San Pedro de Macorís (4), Un total de 30 provincias han reportado casos. Debutan Azua, Pedernales, Barahona, Independencia

ACCIONES ESPECIFICAS DE CONTROL

1. Aislamiento en sala de los casos que requieren tratamiento intrahospitalario.
2. Aislamiento domiciliario de los casos leve en su domicilio hasta tres días de desaparición de los síntomas.
3. Seguimiento de los casos y de sus contactos estrechos.
4. Cumplimiento estricto de las medidas de bioseguridad en los establecimientos de salud
5. El personal de salud, los pacientes y las personas que cuidan de ellos en casa tienen que estar muy alerta para detectar los signos que indican la evolución de la enfermedad hacia una forma mas grave con el fin de acudir tempranamente al médico.

RECOMENDACIONES GENERALES

Para evitar contraer la enfermedad practique frecuentemente el lavado de manos y manejo adecuado de secreciones respiratorias.

Si tiene gripe use mascarilla y evite visitar lugares concurridos. No dude en acudir al médico si además tiene dificultad respiratoria o embarazo o enfermedades del corazón, respiratorias crónica, insuficiencia renal, VIH/SIDA y tuberculosis.

En los niños, los signos de peligro consisten en respiración acelerada, dificultad para respirar, dificultad para despertarse y poco o ningún deseo de comer y jugar.

Las embarazadas y otros grupos de riesgos con gripe deben acudir rápidamente para tratamiento con anti-viral específico de influenza.