



República Dominicana
INFLUENZA HUMANA A-H1N1

BOLETIN ESPECIAL NO. 24

FECHA: 30/09/2009

HORA: 8:00 A.M

Dirección General de Epidemiología

SITUACION MUNDIAL

De acuerdo con el informe de la Organización Mundial de la Salud, hasta el 25 septiembre de 2009, se han notificado 137,147 casos confirmados de gripe por A H1N1 en 35 países de Americas. Se han notificado un total de 3,020 defunciones entre los casos confirmados en 22 países de la Región.

Actualización sobre la información clínica

Los Centros de Prevención y Control de Enfermedades de los EE.UU. han actualizado sus recomendaciones provisionales para los proveedores de atención obstétrica respecto al uso de antivirales durante la estación de influenza 2009-2010*. Ante el mayor riesgo de complicaciones y muerte de las embarazadas, se recomienda el uso temprano de antivirales (preferiblemente dentro de las primeras 48h de inicio de síntomas). Aunque ambos inhibidores de neuraminidasas (oseltamivir y zanamivir) pueden ser considerados para el uso en embarazadas, se recomienda el uso de oseltamivir por su distribución sistémica.

Las recomendaciones sostienen que no es necesario esperar por la confirmación del laboratorio para empezar con el tratamiento antiviral, usando la misma posología de los pacientes adultos †.

Con el fin de asegurar el inicio precoz del tratamiento, los profesionales de salud deben informar a las embarazadas sobre los signos y síntomas de influenza, que son similares a los de la población general. También se ha de facilitar a las embarazadas un mecanismo para acceso rápido a consulta telefónica y evaluación clínica. Se debe realizar el tratamiento sintomático de la fiebre, con acetaminofén, dado el riesgo que implica para el feto.

Comisión
Nacional
de
Influenza

Contenido

Vigilancia intensificada 1

Acciones específicas de control 2

Recomendaciones generales 2

Contactos

Teléfono:
(809) 686-9140

Fax: (809) 689-8395


Página Web:
www.sespasdigepepi.gob.do

	Del 27/04 al 26/09
MORBILIDAD Y MORTALIDAD	
CASOS Y HOSPITALIZACIONES	
Total de casos sospechosos de nueva influenza A H1N1	2514
Total de casos confirmados de nueva influenza A H1N1	424
Total de casos confirmados hospitalizados	191
MUERTES Y LETALIDAD	
Total de muertes confirmadas de nueva influenza A H1N1	22
Letalidad (% de casos fallecidos)	5

En la República Dominicana desde el inicio de la vigilancia epidemiológica del virus de influenza A H1N1, se han estudiado por laboratorio 2514 casos de gripe, se confirmaron 8 nuevos casos del nuevo virus influenza A H1N1, para un total de 424 casos, incluye a 191 personas hospitalizadas. Las personas menores de 29 años aportan la mayor proporción de casos (79%). A la fecha se han reportado 22 defunciones confirmadas. El 82% (18/22) de las defunciones correspondió al sexo femenino y de estas el 55% (12/22) tiene antecedentes de embarazo como factor de riesgo.

Distribución de Los casos

Casos confirmados nueva influenza A H1N1 por provincias de residencia.



Las provincia con mayor número de casos de gripe confirmados a influenza AH1N1 son el Distrito Nacional (143), Santo Domingo (99), Santiago (58), Puerto Plata (24), La Altagracia (21), San Cristóbal (13), Duarte (9), Espaillat (7), Valverde (7) Peravía (6), La Vega (5), San Pedro de Macorís (4), Monte Cristi (4). Un total de 25 provincias han reportado casos.

ACCIONES ESPECIFICAS DE CONTROL

1. Aislamiento en sala de los casos que requieren tratamiento intrahospitalario.
2. Aislamiento domiciliario de los casos leve en su domicilio hasta tres días de desaparición de los síntomas.
3. Seguimiento de los casos y de sus contactos estrechos.
4. Cumplimiento estricto de las medidas de bioseguridad en los establecimientos de salud
5. El personal de salud, los pacientes y las personas que cuidan de ellos en casa tienen que estar muy alerta para detectar los signos que indican la evolución de la enfermedad hacia una forma más grave con el fin de acudir tempranamente al médico.

RECOMENDACIONES GENERALES

Para evitar contraer la enfermedad practique frecuentemente el lavado de manos y manejo adecuado de secreciones respiratorias.

Si tiene gripe use mascarilla y evite visitar lugares concurridos. No dude en acudir al médico si además tiene dificultad respiratoria o embarazo o enfermedades del corazón, respiratorias crónica, insuficiencia renal, VIH/SIDA y tuberculosis.

En los niños, los signos de peligro consisten en respiración acelerada, dificultad para respirar, dificultad para despertarse y poco o ningún deseo de comer y jugar.

Las embarazadas y otros grupos de riesgos con gripe deben acudir rápidamente para tratamiento con antiviral específico de influenza.