

### **Parotiditis**

***Se le recomienda a la población en general, principalmente la residente en comunidades con conglomerados de casos adoptar las siguientes medidas de prevención:***

- Evitar el uso compartido de los artículos personales (vasos, platos, cucharas, pañuelos, otros)
- Desinfectar de manera frecuente los artículos contaminados con secreciones nasales y faríngeas
- Evitar ir a los lugares de trabajos y muy concurridos, así controlamos mas infecciones

***Al personal de salud (médicos, enfermeras, bioanalistas, promotores, voluntarios) que prestan servicios en comunidades afectadas se recomienda:***

- Mantener en 100% la cobertura de vacunación de SRP en la población entre 12-23 meses.
- Vacunar a la población susceptible con edades entre 1-4 años en las comunidades de riesgo.
- Registrar los casos diariamente y notificar a la Dirección Provincial o Municipal de Salud.
- Intensificar las medidas de higiene, especialmente el lavado de las manos antes y después de examinar cada paciente
- Informar a directores de centros educativos, profesores, padres, etc.
- La esterilización sistemática de instrumentos después de su uso y el uso de guantes para el examen de l cada paciente con sospecha de infección.
- En caso de personas afectadas se instruye:
  - Mantener el aislamiento respiratorio evitar contacto con población susceptible evitando las visitas a lugares de trabajos, estudios, iglesias y otros sitios públicos en los primeros nueve días desde el comienzo de la parotiditis
  - Mantener aislamiento de tipo respiratorio durante nueve días desde el comienzo del cuadro clínico
  - No automedicarse. Buscar atención de salud a fin de que el personal le evalúe e indique el tratamiento a seguir.